

# Identification du Patient

Nom de naissance .....

Nom d'usage .....

Prénom .....

Date de naissance .....

Profession .....

Adresse .....

.....

Code postal ..... Ville .....

Tél ..... Portable .....

Adresse mail .....

Cadre réservé à l'Etablissement

Etiquette Patient

Madame, Monsieur,

Vous allez prochainement être hospitalisé(e) dans un des Etablissements Sainte-Marguerite. Les Praticiens, l'ensemble du Personnel et la Direction vous remercient de votre confiance.

Le Praticien qui vous prendra en charge lors de votre hospitalisation vous a remis ce jour ce « livret d'information du patient ».

Comme son nom l'indique, et selon la réglementation en vigueur, ce livret a pour objectif de regrouper les informations médicales et administratives nécessaires vous concernant, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins qui vous seront prodigués.

Vous devrez **lire et compléter** avec attention les différents documents (informations, questionnaires, autorisations) composant ce livret ; ils sont indispensables pour votre admission dans nos établissements. Vous pourrez, si nécessaire, les remplir avec l'aide de vos proches et/ou de votre Médecin traitant.

**Il est essentiel de vous présenter muni(e) de ce livret complété et signé à l'accueil de l'Etablissement avant votre consultation pré-anesthésique**, à l'occasion de laquelle un complément d'informations vous sera donné par le Médecin Anesthésiste-Réanimateur que vous rencontrerez.

Nous compléterons également notre information concernant votre séjour par le livret d'accueil qui vous sera remis lors de la consultation pré-anesthésique.

**D'autres informations sont également disponibles sur le site internet :**

[www.centre-endoscopie.info](http://www.centre-endoscopie.info)

Nous souhaitons que ce livret d'information contribue à renforcer votre confiance quant à la qualité et la sécurité des soins dispensés dans les Etablissements Sainte-Marguerite.

Docteur Bruno THIRE  
Directeur Général

# SOMMAIRE ...



## I. Informations et autorisations réglementaires

1. Informations générales sur l'anesthésie
2. Informations concernant une éventuelle transfusion sanguine et l'administration de médicaments dérivés du sang
3. Informations concernant la lutte contre la douleur
4. Informations concernant le risque de surdosage et d'interactions encourus lors de l'utilisation non contrôlée et non médicalement validée de médicaments
5. La douche préopératoire : prévention des infections nosocomiales
6. Consignes générales avant toute intervention chirurgicale
7. Consignes spécifiques à suivre concernant la chirurgie ambulatoire et l'endoscopie (fibroscopie, coloscopie, gastroscopie, bronchoscopie)
8. Informations concernant l'interdiction de fumer
9. Cas particulier de l'allergie au Latex
10. En vue de la consultation anesthésique, n'oubliez pas d'apporter...
11. Informations données par le Praticien concernant l'intervention endoscopique envisagée
12. Informations données par le Médecin Anesthésiste-Réanimateur sur le type d'anesthésie envisagée
13. Evaluation des risques liés aux ATNC (Agents Transmissibles Non Conventionnels)
14. Dossier anesthésique



## II. Autorisations du patient

1. Autorisations
2. Cas particulier du patient mineur ou du patient majeur sous mesure de protection (sous tutelle)



## III. Engagement du patient hospitalisé



## IV. Désignations / Autorisations administratives et médicales

1. Personne(s) à prévenir
2. Transmissions des informations de santé à des proches
3. Transmissions des informations de santé à des professionnels de santé
4. Désignation de la personne de confiance
5. Demande de non divulgation de présence



## V. Informations médicales avant la réalisation d'une endoscopie digestive



## VI. Validation de la prise de connaissance des informations contenues dans ce livret

# A COMPLETER SI VOUS ÊTES...



## Représentant du patient ou d'un majeur sous tutelle

A compléter si le patient est dans l'impossibilité de renseigner ce livret, et/ou de recevoir l'information

Coordonnées du  représentant /  tuteur<sup>(1)</sup> du patient :

Nom, prénom : .....

Lien avec le patient : .....

Tél. : .....

Portable : .....

Signature du représentant  
ou tuteur du patient



## Titulaire de l'autorité parentale pour un patient mineur

Articles 371-1, 372, 372-2 du Code Civil  
Articles L.1111-5, R.1111-2, R.1112-35 du Code de la Santé Publique

La signature des deux parents est obligatoire lorsque l'autorité parentale est conjointe (enfant né de parents mariés ou né de parents non mariés mais reconnu par les deux parents dans sa première année). Si l'un des parents est éloigné géographiquement, il est possible de nous transmettre les informations contenues dans ce livret avec sa signature par : fax, voie postale ou mail [preadmission@clinique-st-jean.fr](mailto:preadmission@clinique-st-jean.fr)

**Ce livret d'information doit être impérativement complété et signé par les titulaires de l'autorité parentale et présenté à l'accueil de l'Etablissement avant la consultation pré-anesthésique.**  
Auquel cas l'intervention pourra être reportée.

Le ou les signataire(s) de ce livret certifie(nt) et atteste(nt) que son/leur exercice de l'autorité parentale n'a pas été limité par une décision judiciaire. Dans le cas contraire, il est impératif d'adresser à votre médecin, dans les plus brefs délais, une copie de la décision.

Les titulaires de l'autorité parentale :

- s'engagent à s'informer mutuellement de l'hospitalisation de l'enfant, des soins qui lui sont prodigués et de l'évolution de son état de santé
- certifient chacun en ce qui le concerne, que ce livret leur a été expliqué en totalité, qu'ils l'ont lu, complété et compris
- attestent chacun en ce qui le concerne, l'exactitude des renseignements contenus dans ce livret

### Identification des titulaires de l'autorité parentale

Père de l'enfant

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : .....

Tél. : .....

Portable : .....

Adresse : .....

.....

Signature :



Mère de l'enfant

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : .....

Tél. : .....

Portable : .....

Adresse : .....

.....

Signature :



Tuteur<sup>(1)</sup>

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : .....

Tél. : .....

Portable : .....

Adresse : .....

.....

Signature :





## Entrée et sortie d'un patient mineur

Si les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent être présents le jour de l'hospitalisation ou lors de la sortie de l'établissement, la ou les personnes ci-après désignée(s) sont autorisées à accompagner l'enfant <sup>(2)</sup> :

Nom, prénom : .....	Nom, prénom : .....
Lien avec l'enfant : .....	Lien avec l'enfant : .....
Tél. : .....	Tél. : .....
Portable : .....	Portable : .....

### **SECURITE : l'établissement n'autorise pas la sortie d'un patient mineur sans accompagnant.**

<sup>(1)</sup> : une copie de la pièce d'identité du tuteur ainsi que la copie de la décision de placement sous tutelle sera conservée dans le dossier patient.

<sup>(2)</sup> : une pièce d'identité de l'accompagnant doit être obligatoirement présentée à l'IDE du service, une copie sera conservée dans le dossier patient.

## 1. Informations générales sur l'anesthésie

Le dossier anesthésique ci-après (pages 16 et 17) est destiné à vous informer sur l'anesthésie, ses avantages et ses risques. Nous vous demandons de le lire attentivement, afin de pouvoir donner votre consentement à la procédure anesthésique qui vous sera proposée par le Médecin Anesthésiste-Réanimateur. Vous pourrez également poser à ce médecin des questions sur cette procédure. Pour les questions relatives à l'acte médical qui motive l'anesthésie, il appartient au spécialiste qui réalisera cet acte d'y répondre.

## 2. Informations concernant une éventuelle transfusion sanguine et l'administration de médicaments dérivés du sang

*(Information sur la transfusion des patients en anesthésie - SFFAR Mars 2006)*

Si votre état de santé nécessite une transfusion sanguine, ce document est destiné à vous informer sur les avantages et les risques de la transfusion, ainsi que les examens à réaliser avant et après celle-ci.

Dans le cas particulier d'une intervention chirurgicale, il est possible que la décision de transfuser soit prise lorsque vous serez sous anesthésie. En conséquence, cette information est assez largement diffusée en préopératoire, et le fait qu'elle vous soit communiquée ne signifie pas nécessairement que vous recevrez une transfusion.

Si vous avez dû recevoir une transfusion durant l'anesthésie, nous vous en informerons dès votre réveil.

Pour en faciliter la lecture, ce document comporte une première partie résumée « CE QU'IL EST IMPORTANT DE SAVOIR » et une seconde partie plus détaillée « POUR EN SAVOIR PLUS ».

Si une solution alternative à la transfusion homologue est envisageable, telle la transfusion dite « autologue » (votre propre sang mis en réserve), une information particulière vous sera délivrée.

Nous vous invitons à poser au Médecin qui vous informera, toute question sur ce sujet que vous jugerez utile.

## Ce qu'il est important de savoir

### A quoi sert une transfusion et quels en sont les principaux risques ?

La transfusion est un traitement qui peut être nécessaire en cas de manque de globules rouges, de plaquettes, de facteurs de coagulation, de globules blancs. Pour chacune de ces situations, il existe un produit spécifique. Comme tout traitement, la transfusion comporte des avantages et des inconvénients. Elle n'est envisagée par votre médecin que lorsque les bénéfices attendus pour votre santé sont supérieurs aux risques encourus.

Les inconvénients sont rares et le plus souvent sans gravité (urticaire, réaction fébrile).

Les précautions prises permettent de rendre exceptionnels les risques liés aux très nombreux groupes sanguins ou à la transmission de bactéries, et totalement exceptionnels ceux liés à la transmission d'infections virales, notamment les hépatites et le Sida.

### Quelle surveillance en cas de transfusion ?

La recherche systématique de la trace de virus après une transfusion n'est désormais plus recommandée. En revanche, la recherche d'anticorps irréguliers à distance de la transfusion est recommandée afin d'améliorer la sécurité d'une éventuelle transfusion dans le futur.

Il vous sera remis un document comportant la nature et le nombre de produits sanguins que vous aurez reçus. Il est important de conserver ces documents et de les communiquer, ainsi que les résultats des examens, à votre médecin pour lui permettre d'assurer votre suivi.

## Pour en savoir plus...

### Les produits et leurs indications

Les produits sanguins regroupés sous le terme de "produits sanguins labiles" sont les globules rouges, le plasma frais congelé, les plaquettes et, beaucoup plus rarement, les globules blancs. Ces produits proviennent du don de sang de donneurs bénévoles.

Ils sont rigoureusement contrôlés et répondent à des normes obligatoires de sécurité et de qualité : sélection des donneurs, tests de dépistage sur chaque don, règles pour assurer la qualité sur toute la chaîne depuis le donneur jusqu'au receveur.



**Les globules rouges** ont pour fonction le transport de l'oxygène vers les tissus. Leur transfusion est nécessaire en cas d'anémie importante et/ou signes de mauvaise tolérance de celle-ci, dans le but d'éviter des complications, notamment cardiaques.

**Le plasma frais congelé** contient les facteurs permettant la coagulation du sang. Leur transfusion est nécessaire lorsque le taux de ces facteurs dans le sang est trop bas, dans le but de prévenir une hémorragie ou d'en faciliter l'arrêt.

**Les plaquettes** sont indispensables à la formation d'un caillot. Elles sont transfusées si leur nombre est très insuffisant, dans le but de prévenir une hémorragie ou d'en faciliter l'arrêt.

**Les globules blancs** contribuent à la défense contre l'infection. Il peut être nécessaire d'en transfuser lorsqu'ils sont pratiquement absents du sang.

D'une manière générale, tous les efforts sont faits pour limiter l'usage de ces produits au strict nécessaire.

Leurs indications ont notamment été précisées par la communauté médicale et les autorités sanitaires, de telle sorte que leurs bénéfices soient très supérieurs aux risques résiduels de la transfusion.

### Les risques connus

Comme tout traitement, la transfusion sanguine comporte des risques. Des réactions sans conséquences graves peuvent survenir pendant et après transfusion, comme de l'urticaire, ou des frissons et de la fièvre sans cause infectieuse. Les autres risques sont aujourd'hui limités grâce aux mesures déjà prises. Il s'agit :

#### - **Des risques liés aux nombreux groupes sanguins :**

Il est impératif de respecter la compatibilité dans les groupes ABO et rhésus.

Il existe également de nombreux autres groupes sanguins contre lesquels vous avez pu développer des anticorps (appelés "irréguliers"), qu'il importe donc de rechercher avant la transfusion pour en tenir compte dans le choix du produit transfusé.

Votre identité et votre groupe sanguin seront de nouveau vérifiés juste avant la transfusion de globules rouges. La transfusion peut provoquer l'apparition d'anticorps irréguliers (dans 1 à 5 % des cas), ce qui peut avoir des conséquences en cas de transfusion ultérieure.



- **Des risques résiduels de contamination :** Ils continuent de diminuer avec les progrès des connaissances et des techniques. Les estimations issues de l'INVS 2008-2010 sont les suivantes pour les virus :
  - de l'hépatite B : 1/1.850.000 produits
  - de l'hépatite C : 1/7.000.000 produits
  - du Sida : 1/2.900.000 produits
  - les bactéries : 1/200.000 produits

### Les dangers inconnus :

Comme on ne peut, de principe, exclure des dangers inconnus, toutes les mesures possibles de prévention ont été prises, dans la sélection des donneurs de sang (notamment l'exclusion des personnes antérieurement transfusées) et dans la préparation des produits. En outre, une surveillance nationale des incidents de la transfusion a été mise en place depuis 1994 (l'hémovigilance).

Si cela s'avérait nécessaire, des informations complémentaires vous seraient communiquées.

### Les examens biologiques avant et après transfusion :

Le niveau de sécurité désormais atteint en matière de transmission de virus ne rend plus nécessaire la recherche systématique de leur trace avant et après la transfusion.

En revanche, afin de prévenir les risques liés aux très nombreux groupes sanguins, un certain nombre d'examens doivent être effectués.

Avant chaque transfusion : il est obligatoire de disposer des caractéristiques de groupes sanguins du patient (figurant sur la carte de groupe sanguin) ainsi que d'un résultat récent de recherche d'anticorps irréguliers (RAI). L'intervalle de temps entre la RAI et la transfusion elle-même peut varier de 3 jours à plusieurs semaines selon les circonstances cliniques.

Après un épisode transfusionnel et à distance de celui-ci (3 semaines à 3 mois), il est nécessaire de pratiquer un contrôle sanguin (RAI) pour rechercher la présence éventuelle d'anticorps irréguliers consécutifs aux transfusions précédentes.

Si vous avez connaissance que des anticorps irréguliers ont été détectés (notion de RAI positive), il est important, pour votre sécurité, de le signaler au médecin, en cas de nouvelle transfusion.

### Les documents remis et l'importance de leur conservation :

Après une transfusion, il vous est remis avant la sortie, un document écrit comportant la date des transfusions, l'établissement et le service où elles ont été réalisées, le type et le nombre des

produits sanguins labiles reçus. Il est important de conserver ce document avec soin et de le montrer à votre médecin traitant. Il en a besoin pour assurer un suivi médical de qualité. En cas de transfusions régulières, ces informations peuvent être reportées sur un document récapitulatif. Il vous sera également remis à votre sortie une ordonnance pour effectuer une nouvelle recherche de RAI.

En fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, il pourrait être important de re-contacter les personnes transfusées. C'est pourquoi, il est utile que vous informiez de la transfusion votre médecin traitant, notamment si vous en changez.

### **3. Informations concernant la lutte contre la douleur**

Selon les articles L.710-3-1 et 710-3-2 de la Loi n° 95-116 du 4 février 1995, les établissements de santé sont tenus de prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent.

Dans cet établissement, les équipes soignantes s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour prendre en charge votre douleur, la soulager et vous donner toutes les informations utiles. Pour cela, votre participation est primordiale. C'est pourquoi un questionnaire « douleur » vous sera remis au cours de votre hospitalisation.

Vous trouverez également inclus au livret d'accueil qui vous sera remis lors de la consultation pré-anesthésique, un document détaillé relatif aux modalités de lutte contre la douleur.

### **4. Informations sur le risque de surdosage et d'interactions encourus lors de l'utilisation non contrôlée et non médicalement validée de médicaments**

Lors de **l'utilisation non contrôlée de médicaments** deux risques principaux sont encourus :

- **LE SURDOSAGE** : la quantité de médicament est supérieure à la dose thérapeutique ou toxique ; elle peut alors provoquer des troubles graves voire mortels.
- **L'INTERACTION MEDICAMENTEUSE** : quand un médicament modifie l'effet d'un autre médicament présent au même moment dans l'organisme, on dit qu'il y a interaction médicamenteuse. Celle-ci peut être positive et voulue, ou bien négative et à éviter. Mais,

en règle générale, les interactions médicamenteuses sont à éviter, car elles peuvent entraîner soit l'échec d'un traitement, soit une amplification des effets prévus, soit des effets toxiques graves, voire mortels.

L'addition des effets : par exemple, les actions de deux anticoagulants, deux hypnotiques, deux produits contenant du paracétamol vont s'ajouter partiellement ou totalement.

La potentialisation des effets : au lieu de s'additionner, les effets se multiplient.

L'inhibition des effets : l'efficacité d'un médicament est diminuée, voire annihilée par l'administration d'un second.

A ces deux risques s'ajoute le risque induit par l'intervention que vous allez subir ou que vous avez subi. En effet certains médicaments ne sont pas compatibles avec une intervention chirurgicale : exemple les anticoagulants qui font saigner.

La polymédication, les sujets âgés, l'insuffisance rénale ou hépatique renforcent le risque encouru.

**Aussi nous vous demandons de signaler au personnel soignant tous les médicaments que vous avez pris avant l'intervention, et de ne prendre aucun médicament de votre propre initiative et sans en avoir référé au praticien ou au personnel soignant qui vous a en charge, durant votre hospitalisation.**

### **5. Informations sur la douche préopératoire : prévention des infections nosocomiales**

La prévention des infections nosocomiales en chirurgie commence au domicile ou à l'Hôpital la veille au soir de l'opération par des mesures du domaine de l'hygiène de base que sont la douche ou la toilette corporelle, le shampooing et le brossage des dents... et se poursuivra tout au long de l'hospitalisation avec une attention particulière le jour de l'opération.

#### **Le Saviez-vous ?**



Le corps humain contient 10 fois plus de germes que de cellules... Même saine, la peau et les muqueuses (nez, bouches, tube digestif, parties génitales...) sont largement colonisées par des microorganismes<sup>(1)</sup> plus connus sous le nom de microbes.



La préparation de la peau avant une opération chirurgicale est essentielle pour prévenir le risque d'infection nosocomiale du site opératoire puisqu'elle permet de nettoyer la peau et d'abaisser le nombre de microorganismes<sup>(1)</sup> (microbes) présents sur la peau afin qu'ils ne pénètrent pas dans le corps par l'incision chirurgicale.

Cette préparation s'effectue en plusieurs étapes, la douche préopératoire en est la première.

Les experts hygiénistes<sup>(2)</sup> recommandent deux douches, une la veille de l'opération (cheveux compris) et une le jour de l'intervention.

La douche peut être effectuée avec le savon ou le gel douche de la maison, la veille de l'intervention. Le shampoing peut être réalisé avec un shampoing ordinaire.

Le jour de l'intervention vous prendrez une douche 2 heures avant l'intervention.

Cette douche préopératoire sera suivie au niveau du bloc opératoire d'une déterision<sup>(3)</sup> du site opératoire avec un savon antiseptique<sup>(4)</sup>. Cette déterision permet d'éliminer la flore microbienne transitoire de la peau et de diminuer de manière importante et ponctuelle la flore permanente de la peau.

*Microorganisme*<sup>(1)</sup> = organisme microscopique = terme générique utilisé pour définir des particules biologiques (bactéries, virus, champignons, parasites...) capables de se multiplier selon des critères variables de température, d'humidité, de substrats présents.

*Experts hygiénistes*<sup>(2)</sup> = regroupement de sociétés savantes et de professionnels de l'hygiène autour de « gestion préopératoire du risque infectieux ». Conférence de consensus sur ce thème - Paris 05 mars 2004.

*Déterision*<sup>(3)</sup> = nettoyage de la peau avec un savon antiseptique.

*Antiseptique*<sup>(4)</sup> = produit ou procédé utilisé pour l'antiseptie dans des conditions définies / *Antiseptie* = opération au résultat momentané permettant, au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur tolérance, d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus, en fonction des objectifs fixés.

**Au domicile comme à l'Hôpital, la douche s'accompagne :**

- d'un brossage des dents ou d'un soin de bouche (appareil dentaire)
- de linge de toilette propre : gant propre, serviette d'essuyage propre

Pour rester propre après la douche :

- d'un pyjama ou d'une chemise de nuit propre (la veille au soir de l'opération)
- de sous-vêtements et habits propres (pour se rendre à l'Hôpital)
- d'une chemise d'opéré propre (le jour de l'opération en service de soins)


Enfin, la literie doit aussi être propre (draps, taie d'oreiller changés pour l'occasion).

## Recommandations pratiques qui rendent la douche préopératoire efficace

- **Patient adulte dépendant** : les proches et le personnel soignant apportent aide et assistance.
- **Enfants** : les proches apportent aide et assistance.
- **Patient autonome** : il procède lui-même à la réalisation de ses douches.

**Pour une douche préopératoire efficace, vous devez :**

- **ôter le maquillage et le vernis à ongles, les faux ongles** (les ongles doivent être courts et nets).
- retirer vos bijoux, piercing compris.
- vous mouiller l'ensemble du corps, des cheveux jusqu'aux pieds.
- vous savonner à mains nues ou avec un gant propre, de haut en bas (à l'exception des yeux)



- vous rincer abondamment et soigneusement de haut en bas
- renouveler une fois encore l'opération de lavage en insistant sur les mêmes parties du corps
- vous essuyer avec une serviette propre
- vous vêtir avec du linge propre

Attention, le rasage de la zone opératoire avec un rasoir mécanique est fortement déconseillé.

## 6. Consignes générales avant toute intervention chirurgicale

### Concernant l'anesthésie

Si votre état de santé se modifiait entre votre consultation pré-anesthésique et votre admission (changement de traitement, état fébrile ou infectieux, grossesse), prévenez au plus tôt votre Praticien ou la Direction des Soins en téléphonant au standard de l'Etablissement (numéro de téléphone en page de garde du présent livret).

Pensez à retirer vos verres ou lentilles de contact ; si vous portez une prothèse dentaire, munissez-vous d'une boîte de rangement, car vous devrez retirer votre prothèse avant de vous rendre au bloc opératoire.

**Présentez-vous sans maquillage, sans vernis à ongles, ni faux ongles, sans bijoux ni piercings.**

#### Avant l'anesthésie



Vous devez être **à jeun**  
(ni boire, ni manger, ni mâcher de chewing-gum, ni sucette pour les enfants)  
**durant les 6 heures qui précèdent l'heure prévue pour votre anesthésie.**



De plus, il est strictement **interdit de consommer de l'alcool et/ou de fumer (y compris cigarette électronique) durant les 12 heures qui précèdent votre admission.**

### **7. Consignes spécifiques à suivre concernant la chirurgie ambulatoire et l'endoscopie**

*(fibroscopie, coloscopie, gastroscopie, bronchoscopie)*

Vous allez être admis en Unité de Chirurgie Ambulatoire pour un acte chirurgical ou pour un examen endoscopique ; votre retour à domicile est donc prévu le jour même.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter, d'une part les consignes générales avant toute intervention, et d'autre part les quelques recommandations suivantes, indispensables au bon déroulement de votre séjour :

#### Après l'anesthésie

Pour votre sécurité, à la sortie du bloc opératoire, vous allez transiter par une salle de surveillance post-interventionnelle (salle de réveil).

Une collation vous sera proposée dans l'établissement avant votre départ.

Evitez de prendre toutes décisions importantes dans les 48 heures qui suivent l'anesthésie.

#### Déplacements

Il est indispensable que vous soyez accompagné(e) par une personne.

Pour un enfant, nous vous recommandons la présence de deux adultes pour faciliter le retour en voiture au domicile

#### **Prévoyez impérativement :**

- d'être accompagné(e) par un proche en voiture à votre domicile
- qu'un membre de votre famille ou un proche reste auprès de vous pendant 24 heures
- un repos d'une journée ou d'une durée déterminée par votre Praticien

Enfin, malgré la simplicité de l'examen ou de l'intervention, une hospitalisation éventuelle ne peut être exclue. Toutes ces mesures sont prévues pour votre confort, mais aussi pour votre sécurité. Elles sont indispensables et doivent donc être scrupuleusement respectées.

### **8. Informations concernant l'interdiction de fumer**

Conformément à la réglementation :

- décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer
- circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en œuvre des conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les établissements de santé
- circulaire du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux
- arrêté du 3 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation



Nous vous rappelons l'interdiction stricte de fumer dans tous les bâtiments des Etablissements Sainte-Marguerite, depuis le 1<sup>er</sup> Février 2007.

Il est bien entendu interdit aux patients ainsi qu'aux visiteurs, de fumer, que ce soit dans les chambres ou ailleurs. Un espace fumeur est aménagé à l'extérieur de l'Etablissement.

Nous remercions les Patients et leurs proches de nous aider dans cette démarche.

## **9. Cas particulier de l'allergie au Latex**

Dans cet établissement, les patients présentant une allergie au Latex font l'objet d'une prise en charge spécifique et adaptée.

Les modalités de cette prise en charge pluridisciplinaire et complexe vous seront présentées par le Praticien et le Médecin Anesthésiste-Réanimateur qui vous prendront en charge.

## **10. En vue de la consultation pré-anesthésique, n'oubliez pas d'apporter :**

- Votre carte d'identité ou passeport en cours de validité
- Votre carte vitale d'assuré social **A JOUR** ou une carte d'affiliation à un autre organisme
- Votre carte mutualiste ou accord de prise en charge si vous bénéficiez d'une mutuelle
- **La photocopie de l'ordonnance de votre traitement médical personnel en cours**
- Vos examens complémentaires : résultats des analyses biologiques, radiographies, scanner, examen cardiologique (ECG)...
- Votre carte de groupe sanguin, si vous en possédez une

En plus des documents ci-dessus, **pour un PATIENT MINEUR, il est obligatoire de présenter les documents suivants :**

- **La carte d'identité ou le passeport en cours de validité du ou des titulaires de l'autorité parentale**
- **Le livret de famille**
- **Le carnet de santé et de vaccination**



## 11. Informations données par le Praticien concernant l'intervention endoscopique envisagée

### CONSENTEMENT ECLAIRÉ

Docteur, suite aux informations données, en accord avec les dispositions du Code de la Santé Publique (Article L 1111-4 et R 4127-36) c'est bien volontiers que :

Je vous confirme que vous m'avez exposé les risques inhérents à toute intervention endoscopique s'effectuant sous anesthésie locale, locorégionale ou générale. S'y ajoutent un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux, tenant non seulement à la maladie, aux traitements suivis ou réalisés mais également à des réactions individuelles imprévisibles.

J'atteste que vous m'avez informé(e) des risques particuliers liés à l'acte suivant :

**Coloscopie**     **Gastroscopie**     **Cathétérisme bilio-pancréatique**     **Echo-endoscopie**  
(voir pages 35 et suivantes « Informations médicales avant la réalisation d'une endoscopie digestive »)

Je reconnais aussi que j'ai pu vous poser librement toutes les questions concernant cette intervention ainsi que les complications possibles et que j'ai pris note, outre les risques précédemment cités, qu'il existe une imprévisibilité dans la durée de l'intervention, dans les variations anatomiques, dans les cicatrifications ; ainsi que dans l'existence de risques exceptionnels, voir même inconnus.

J'ai également été informé qu'au cours de l'intervention et des soins suivants cette intervention, l'anesthésiste et vous-même pouvez vous trouver face à une maladie ou un événement imprévu imposant des actes et/ou des examens complémentaires ou différents de ceux prévus initialement et je vous autorise ainsi que l'anesthésiste à effectuer tout acte et/ou examen que vous estimerez nécessaires dans ce contexte.

Je reconnais que, d'un commun accord, nous sommes convenus **d'un délai minimum à respecter entre la consultation et l'intervention prévue** et que dans cet intervalle, vous êtes à ma disposition pour répondre à toute interrogation et à celle de mon médecin traitant.

Je m'engage expressément à me rendre à vos consultations et à me soumettre à tous les soins et recommandations que vous me prescrirez en pré et en post-opératoire.

J'atteste avoir pris connaissance de toutes les informations contenues dans ce livret d'information.

Je, soussigné(e),

- Déclare ne pas ignorer que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat Médecin - Patient qui nous lie lors de toute intervention ;
- Certifie l'exactitude et la sincérité des déclarations portées sur le questionnaire médical, ceci avec l'aide éventuelle de mon médecin traitant si nécessaire ;
- Certifie ne pas avoir caché ou dissimulé d'éléments nécessaires au Dr ..... pour apprécier les risques afin que mon intervention sous anesthésie locale, locorégionale ou générale puisse être exécutée en toute sécurité.

Fait à ..... Le.....

**Nom et signature  
du Praticien responsable du patient**



**Nom de naissance et signature du patient  
ou de son représentant  
(précédée de la mention « lu et approuvé »)**





**12. Informations données par le Médecin Anesthésiste - Réanimateur concernant le type d'anesthésie envisagée**

**CONSENTEMENT ECLAIRÉ ANESTHÉSIQUE**  
**(A compléter lors de la consultation pré-anesthésique)**

Je, soussigné(e), reconnais avoir été suffisamment informé(e) sur les risques anesthésiques inhérents à mon intervention endoscopique et avoir pu poser les questions que je désirais au Médecin Anesthésiste-Réanimateur (voir informations pages 16 et 17).

J'accepte également les modifications de méthode, qui pourraient s'avérer utiles pendant l'intervention, jugées indispensables par le Médecin Anesthésiste - Réanimateur.

Fait à ..... Le.....

**Nom et signature  
du Médecin Anesthésiste-Réanimateur**

**Nom de naissance et signature du patient  
ou de son représentant**  
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

*Ce document ne constitue pas une décharge de responsabilité du Médecin Anesthésiste-Réanimateur. Son absence, toutefois, nous contraindrait à surseoir à votre anesthésie.*



**13. Evaluation des risques liés aux ATNC (Agents Transmissibles Non Conventionnels)  
(à remplir avec le praticien lors de la consultation)**

Vous allez entrer à l'Hôpital pour y subir un acte à visée diagnostique ou thérapeutique. Afin de prévenir et de dépister un éventuel risque de transmission de la Maladie de Creutzfeldt-Jakob et variante ou EST (Encéphalopathie Spongiforme Transmissible) dans le cadre de l'Instruction DGS/RI3/n°449 du 01/12/2011 et de la circulaire n° DGS/SD5C/DHOS n°435 du 23/09/2005, nous vous prions de répondre au questionnaire suivant, éventuellement avec l'aide de votre médecin.

1. Avez-vous été traité pour des troubles de la croissance par des injections d'hormone de croissance d'origine humaine ? oui  non
2. Avez-vous subi une intervention avec greffe de dure-mère d'origine humaine ? oui  non
3. Un membre de votre famille génétique a-t-il été atteint d'une Encéphalopathie Spongiforme Transmissible liée à une mutation codant la PrP ? oui  non
4. Avez-vous été identifié comme ayant reçu des produits sanguins labiles d'un donneur reconnu a posteriori comme atteints de la variante-MCJ ? oui \* non

\*Si oui, tous les actes invasifs seront considérés comme à risque vis-à-vis des ATNC

Je, soussigné(e), atteste de l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

Date, nom de naissance et signature du patient  
ou de son représentant

**P a r t i e   r é s e r v é e   a u   p r a t i c i e n**

Le patient présente-t-il après élimination des autres causes possibles, un signe neurologique d'apparition récente et d'évolution progressive sans rémission, d'au moins un signe clinique neurologique (*Myoclonies, troubles visuels ou cérébelleux ou pyramidaux ou extrapyramidaux, ataxie, chorée, dystonie, symptômes sensitifs douloureux persistants, épilepsie, mutisme akinétique*) associé à des troubles intellectuels (*démence, ralentissement psychomoteur*) ou psychiatriques (*dépression, anxiété, apathie, comportement de retrait, délire*).

Si le patient présente une suspicion d'EST, il faut revoir l'indication de l'acte et demander au préalable un examen neuropathologique et si la conclusion est positive en faveur d'une suspicion, il faut appliquer les modalités de traitement recommandées dans l'Instruction N°449.

Selon le processus déclaratif du patient et l'examen clinique, veuillez cocher la case qui correspond au niveau où se répertorie le patient :


**PNSNA**

**Patients Ni Suspects Ni Atteints**  
regroupant les patients sans caractéristique particulière et ceux ayant répondu positivement aux précédentes questions sans confirmation de la suspicion d'EST

**PSA**

**Patients Suspects ou Atteints**  
Si confirmation de la suspicion par un examen neuropathologique

**Nom et signature du praticien responsable du patient**



# Dossier Anesthésique

Nom de naissance :  
Nom d'usage :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Age :

*Etiquette patient*

## 14. Informations générales sur l'anesthésie

Département d'Anesthésie-Réanimation  
Hôpital Privé Toulon Hyères – Saint Jean  
Avenue Georges Bizet  
Téléphone : 04.98.00.14.70 - Fax : 04.94.00.14.74  
Email : [scpcsj83@wanadoo.fr](mailto:scpcsj83@wanadoo.fr)



Docteur BALEZ Vincent  
Docteur FADE Benoît  
Docteur ISNARD Georges

Docteur JOLY Fabrice  
Docteur KADOCH Ruben  
Docteur LOUVEL-ZBYTEK Françoise

Docteur OTTOMBRE David  
Docteur VASSALLO-CECCALDI Dominique

Ce dossier anesthésique est destiné à vous informer sur l'anesthésie, ses avantages et ses risques. Nous vous demandons de le lire attentivement, afin de pouvoir donner votre consentement à la procédure anesthésique qui vous sera proposée par le Médecin Anesthésiste-Réanimateur. Vous pourrez également poser à ce médecin des questions sur cette procédure. Pour les questions relatives à l'acte médical qui motive l'anesthésie, il appartient au spécialiste qui réalisera cet acte d'y répondre.

### quelques heures avant l'anesthésie selon les modalités d'hospitalisation.

Au cours de la consultation et de la visite, vous êtes invité(e) à poser les questions que vous jugerez utiles à votre information. Le choix du type d'anesthésie sera déterminé en fonction de l'acte prévu, de votre état de santé et du résultat des examens complémentaires éventuellement prescrits. Le choix final relève de la décision et de la responsabilité du Médecin Anesthésiste-Réanimateur qui vous prendra en charge lors de l'anesthésie.

### Qu'est-ce que l'Anesthésie ?



L'anesthésie est un ensemble de techniques qui permet la réalisation d'un acte chirurgical, obstétrical ou médical (endoscopie, radiologie...), en supprimant ou en atténuant la douleur. Il existe deux grands types d'anesthésie : l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale.

**L'anesthésie générale** est un état comparable au sommeil, produit par injection de médicaments par voie intraveineuse et/ou par la respiration de vapeurs anesthésiques, à l'aide d'un dispositif approprié.

**L'anesthésie loco-régionale** permet, par différentes techniques, de n'endormir que la partie de votre corps sur laquelle se déroulera l'opération. Son principe est de bloquer les nerfs de cette région, en injectant à leur proximité un produit anesthésique local. Une anesthésie générale peut être associée ou devenir nécessaire, notamment en cas d'insuffisance de l'anesthésie loco-régionale.

La rachianesthésie et l'anesthésie péridurale sont deux formes particulières d'anesthésie loco-régionale, où le produit anesthésique est injecté à proximité de la moelle épinière et des nerfs qui sortent de celle-ci.

**Toute anesthésie générale, ou loco-régionale, réalisée pour un acte non urgent, nécessite une consultation plusieurs jours à l'avance et une visite pré-anesthésique, la veille ou**

### Quelle sera la surveillance pendant l'anesthésie et à votre réveil ?



L'anesthésie, quelque soit son type, se déroule dans une salle équipée d'un matériel adéquat, adapté à votre cas et vérifié avant chaque utilisation. Tout ce qui est en contact avec votre corps, est soit à usage unique, soit désinfecté ou stérilisé. En fin d'intervention, vous serez conduit(e) dans une salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI ou salle de réveil) pour y être surveillé(e) de manière continue avant de regagner votre chambre ou de quitter l'établissement. Durant l'anesthésie et votre passage en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), vous serez pris(e) en charge par un personnel infirmier qualifié, sous la responsabilité d'un Médecin Anesthésiste-Réanimateur.

### Quels sont les risques de l'anesthésie ?

Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la science, comporte un risque. Les conditions actuelles de surveillance de l'anesthésie et de la période du réveil, permettent de dépister rapidement les anomalies et de les traiter. Pour cela, il est important de faire part au Médecin Anesthésiste-Réanimateur et au personnel infirmier chargé de la surveillance, de tous les maux que vous pourriez ressentir au cours et après une anesthésie.



### Quels sont les inconvénients et les risques de l'anesthésie générale ?

Les nausées et les vomissements au réveil sont devenus moins fréquents avec les nouvelles techniques et les nouveaux médicaments.

Les accidents liés au passage de vomissements dans les poumons sont très rares si les consignes de jeûne sont bien respectées.

L'introduction d'un tube dans la trachée (intubation) ou dans la gorge (masque laryngé) pour assurer la respiration pendant l'anesthésie peut provoquer des maux de gorge et un enrouement passagers.

Des traumatismes dentaires sont également possibles. C'est pourquoi il est important que vous signaliez tout appareil ou toute fragilité dentaire particulière.

Une rougeur douloureuse au niveau de la veine dans laquelle les produits ont été injectés peut s'observer ; elle disparaît en quelques jours.

La position prolongée sur la table d'opération peut entraîner des compressions, notamment de certains nerfs, ce qui peut provoquer un engourdissement ou, exceptionnellement, la paralysie d'un bras ou d'une jambe. Dans la majorité des cas, les choses rentrent dans l'ordre en quelques jours ou quelques semaines. Des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

**Durant les 24h qui suivent l'anesthésie**, il est vivement conseillé de ne pas prendre d'alcool, ne pas conduire de véhicule, ne pas utiliser d'appareils potentiellement dangereux, ne pas prendre de décisions importantes, **vo**  
**tre vigilance pouvant être réduite sans que vous ne vous en rendiez compte.**

Des complications imprévisibles comportant un risque vital comme une allergie grave, un arrêt cardiaque, une asphyxie, sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits, alors que des centaines de milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.

### Quels sont les inconvénients et les risques de l'anesthésie loco-régionale ?

Après une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale, des maux de tête peuvent survenir qui nécessitent parfois un repos de plusieurs jours et/ou un traitement local spécifique.

Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire.

Des douleurs au niveau du point de ponction dans le dos sont également possibles.

Une répétition de la ponction pendant la réalisation de l'anesthésie peut être nécessaire en cas de difficulté.

Des démangeaisons passagères peuvent survenir lors de l'utilisation de la morphine ou de ses dérivés.

Très rarement, on peut observer une baisse transitoire de l'acuité visuelle ou auditive.

En fonction des médicaments associés, des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

Des complications plus graves comme des convulsions, un arrêt cardiaque, une paralysie permanente ou la perte plus ou moins étendue des sensations sont extrêmement rares.

Quelques cas sont décrits, alors que des centaines de milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.

Au cours de l'anesthésie loco-régionale en ophtalmologie, un traumatisme du globe oculaire est exceptionnel.

### Organisation des consultations d'Anesthésie

Pour des raisons d'organisation interne (durée d'intervention variable, date d'intervention fixée par le praticien avec votre accord) le Médecin Anesthésiste-Réanimateur qui réalise la consultation peut ne pas être celui qui effectue l'anesthésie le jour de l'intervention. Néanmoins, le Médecin consultant a pris la précaution de transmettre votre dossier à son confrère qui vous prend en charge pendant l'anesthésie. De même, au cours de la période post-opératoire, vous pourrez être amené(e) à rencontrer d'autres membres de l'équipe d'Anesthésie-Réanimation.

Une procédure d'anesthésie est proposée et peut être modifiée en connaissance de résultats paracliniques, de modification de votre état de santé et de l'examen réalisé lors de la consultation d'anesthésie.

**IMPORTANT** : le questionnaire ci-après prépare la consultation d'Anesthésie.

**REMP LISSEZ-LE AVEC SOIN A DOMICILE OU AVEC VOTRE MEDECIN TRAITANT**

*Munissez-vous impérativement de vos ordonnances, électrocardiogramme, examens, carnet de santé.*

# A COMPLETER PAR LE PATIENT

## 15. Questionnaire Anesthésie

Nom de naissance : ..... Prénom : .....  
Nom d'usage : ..... Date de naissance : .....  
Adresse : ..... Tél. : .....  
Poids : ..... Taille : ..... Profession : .....  
Variation de poids récente :  non  oui si oui :  
Prise de poids : ..... kg depuis : .....  
Perte de poids : ..... kg depuis : .....  
Intervention : ..... Chirurgien : .....  
..... Gynécologue : .....  
Date de l'intervention : ..... Généraliste : .....

**IMPORTANT** : ce questionnaire prépare la consultation d'Anesthésie.  
**REPLISSEZ-LE AVEC SOIN A DOMICILE OU AVEC VOTRE MEDECIN TRAITANT**  
*Munissez-vous impérativement de vos ordonnances, électrocardiogramme, examens, carnet de santé.*

**Recopiez** la liste de VOS médicaments ci-dessous  Aucun traitement en cours

Médicament	Dosage	Matin	Midi	Soir	Médicament	Dosage	Matin	Midi	Soir
.....					.....				
.....					.....				
.....					.....				
.....					.....				
.....					.....				

- Durant les 12 derniers mois...**  
Avez-vous été hospitalisé(e)s en Réanimation, Soins Intensifs... ? oui  non   
Avez-vous été hospitalisé(e)s à l'étranger ? oui  non
- Etes-vous porteur connu d'une Bactérie Multirésistante aux antibiotiques (BMR) ou avez-vous été en contact avec un patient porteur d'une BMR ?** oui  non
- Etes-vous porteur connu d'une Bactérie Hautement Résistante aux antibiotiques émergente (BHRe) ou avez-vous été en contact avec un patient porteur d'une BHRe ?** oui  non
- Avez-vous eu un traitement antibiotique intensif et multiple ces 6 derniers mois ?** oui  non
- Avez-vous déjà été opéré(e), anesthésié(e), hospitalisé(e) ?** oui  non   
Si oui, pour quoi et quand ? .....  
.....  
.....  
.....
- Avez-vous eu des anesthésies générales ?** oui  non
- Avez-vous eu des anesthésies locales, dentaires ou autres ?** oui  non
- Avez-vous présenté des complications lors de précédentes anesthésies ?** oui  non   
Si oui, lesquelles ? .....  
.....  
.....
- A-t-on signalé dans votre famille des problèmes dus aux anesthésies ?** oui  non   
Si oui, lesquels ? .....  
.....

# A COMPLETER PAR LE PATIENT

Nom de naissance :  
 Nom d'usage :  
 Prénom :  
 Date de naissance :  
 Age :

*Etiquette patient*

## 10) Avez-vous (eu) des problèmes :

### Cardio-vasculaires

Nom du cardiologue : .....

Date de la dernière consultation : .....

- Hypertension artérielle (HTA)      oui  non
- Souffle au cœur      oui  non
- Angine de poitrine :  
   Douleurs à l'effort      oui  non   
   Douleurs au repos      oui  non
- Avez-vous eu :  
   Un infarctus      oui  non   
   Des palpitations      oui  non   
   Une insuffisance cardiaque      oui  non
- Avez-vous des problèmes artériels :  
   Artérite      oui  non   
   Problème de carotides      oui  non   
   Artérite des membres inférieurs      oui  non
- Avez-vous des problèmes veineux :  
   Varices      oui  non   
   Jambes lourdes      oui  non   
   Antécédent de phlébite      oui  non   
   Antécédent d'embolie pulmonaire      oui  non   
   Paraphlébite      oui  non
- Avez-vous eu des examens complémentaires :  
   Epreuve d'effort      oui  non   
   Coronarographie      oui  non   
   Autres : .....      oui  non
- Avez-vous des stents (ressorts)      oui  non
- Avez-vous un pacemaker      oui  non

### Pulmonaires

- Etes-vous fumeur :      oui  non   
   Si oui, nombre de cigarettes par jour : .....
- Consommez-vous des stupéfiants      oui  non
- Avez-vous des problèmes d'asthme      oui  non   
   Si oui : crises fréquentes      oui  non   
   Asthme de l'enfance      oui  non   
   Traité      oui  non
- Avez-vous des problèmes de bronchites :  
   Chronique      oui  non   
   A répétition      oui  non   
   Emphysème      oui  non
- Toux matinale      oui  non

### Digestifs

- Avez-vous déjà subi :  
   Une fibroscopie      oui  non   
   Une coloscopie      oui  non
- Avez-vous des problèmes gastriques :  
   Ulcère gastrique      oui  non   
   Hernie hiatale      oui  non   
   Brûlures d'estomac      oui  non   
   Intolérance aux anti-inflammatoires      oui  non
- Consommation d'alcool :  
   Vin      oui  non   
   Autres : .....      oui  non
- Avez-vous des problèmes intestinaux :  
   Constipation      oui  non   
   Diarrhée      oui  non   
   Sang dans les selles      oui  non

- Prenez-vous des laxatifs      oui  non
- Avez-vous des problèmes hépatiques :  
   Hépatite A      oui  non   
   Hépatite B      oui  non   
   Hépatite C      oui  non   
   Autres : .....      oui  non
- Autres problèmes : .....

### Néphrologie/Urologie

- Calculs      oui  non
- Infections urinaires      oui  non
- Insuffisance rénale chronique      oui  non
- Hommes :  
 Avez-vous des problèmes de prostate      oui  non

### Gynécologie

- Nombre de grossesses : .....
- Nombre d'accouchements : .....
- Date des dernières règles : .....
- Etes-vous enceinte ?      oui  non
- Avez-vous eu une péridurale pour votre / vos  
 accouchement(s) ?      oui  non

### Neurologie

- Migraines céphalées      oui  non
- Epilepsie      oui  non
- Convulsions de l'enfance      oui  non
- Spasmophilie      oui  non
- Tétanie      oui  non
- Hémiplégie      oui  non
- Troubles de la parole      oui  non
- Accident vasculaire cérébral      oui  non

### Allergies

- Avez-vous eu des problèmes d'allergie ?      oui  non
- Si oui, lesquels ?  
   • **Caoutchouc ou latex**      oui  non
- Urticaire      oui  non
- Rhume des foins      oui  non
- Eczéma      oui  non
- Asthme      oui  non
- Œdème de Quincke      oui  non
- Alimentaires :      oui  non   
     Banane, kiwi, avocat, châtaigne, melon  
     Autres : .....
- Antibiotique      oui  non
- Aspirine      oui  non
- Autres médicaments      oui  non
- Si oui, lesquels : .....
- Lors d'un examen radiologique      oui  non

# A COMPLETER PAR LE PATIENT



## Autres pathologies

- Avez-vous un diabète oui  non   
Si oui, traité par : comprimé   
insuline   
régime
- Depuis quand ? .....
- Avez-vous des problèmes psychologiques  
Dépression oui  non   
Anxiété oui  non   
Insomnie oui  non
- Avez-vous un glaucome oui  non   
- Avez-vous des prothèses ?  
Lentilles oui  non   
Prothèse auditive oui  non   
Autre : ..... oui  non
- Présentez-vous des apnées durant votre sommeil ? oui  non   
Si oui, êtes-vous appareillé(e) ? oui  non

Examens complémentaires déjà réalisés : .....

11) Avez-vous été transfusé(e) ? oui  non

Si oui, à quelle(s) date(s) ? : .....

Avez-vous eu un contrôle sérologique depuis ? oui  non

Êtes-vous opposé à une transfusion en cas d'urgence ? oui  non

Si oui, motif : .....

Signature du patient ou de son représentant



12) Statut viral :

Avez-vous eu une recherche des sérologies : de l'hépatite B ? oui  non

de l'hépatite C ? oui  non

VIH\* ? oui  non

**Un bilan sérologique viral pourra être effectué durant votre hospitalisation en cas d'accident d'exposition au sang du personnel, sauf avis contraire de votre part : VIH\*, Hépatite B, Hépatite C.**

Autorisez-vous le contrôle ? oui  non

Si non, motif : .....

Avez-vous pris de l'aspirine ou dérivé dans les 8 derniers jours ? oui  non

Auriez-vous quelque chose à signaler qui ne soit pas dans ce questionnaire ?

.....  
.....  
.....

*Je, soussigné(e), atteste de l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.*

Nom de naissance et signature du patient  
ou de son représentant



\* Virus de l'Immunodéficience Humaine ou virus du SIDA



## 16. Questionnaire dentaire

- Portez-vous une ou deux prothèses amovibles ? oui  non 
  - Partielle  maxillaire supérieur  maxillaire inférieur
  - Complète  maxillaire supérieur  maxillaire inférieur
  
- Certaines de vos dents vous semblent-elles plus fragiles et doivent-elles requérir une attention spéciale lors de l'anesthésie ? oui  non 

Si oui, lesquelles ? .....

.....
  
- Certaines de vos prothèses se descellent-elles souvent ? oui  non
  
- Avez-vous des dents mobiles ou déchaussées ? oui  non
  
- Êtes-vous en cours de traitement chez votre dentiste ? oui  non
  
- Avez-vous déjà suivi un traitement pour déchaussement de vos dents ? oui  non
  
- Portez-vous des prothèses provisoires ? oui  non
  
- Avez-vous en bouche un travail dentaire en cours (datant de moins d'un an) ? oui  non 

Si oui, de quel type et à quel endroit ? .....

.....

.....
  
- Avez-vous des troubles des articulations des mâchoires ? oui  non

Vous êtes informé(e) que le risque dentaire dans le cadre de l'anesthésie générale existe et qu'il est d'autant plus grand si votre dentition est fragile. Nous vous engageons à effectuer une visite chez votre dentiste traitant afin d'évaluer ce risque et d'en informer le Médecin Anesthésiste.

**Date, nom de naissance et signature du patient  
ou de son représentant**



## 17. Consultation pré anesthésique

### A compléter par l'Anesthésiste

Nom de naissance :  
Nom d'usage :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Age :

*Etiquette patient*

Nom de l'Anesthésiste : .....

Date de la consultation : ..... / ..... / .....

Consultation d'anesthésie pour chirurgie urgente :  oui  non

Estomac plein :  oui  non

Intervention prévue : .....

Chirurgien : .....

Date : .....

Date d'hospitalisation : .....

Ambulatoire  Hospitalisation

#### Antécédents chirurgicaux :

.....  
.....  
.....  
.....

#### Antécédents anesthésiques :

.....  
.....

#### Antécédents médicaux :

- Cardiovasculaires :  HTA  Pacemaker  Défibrillateur implantable  Maladie coronaire  
 RAS  Stents conventionnels  Stents Actifs  IDM  Troubles du rythme/FA  
 Angor Stable  Angor Instable  Autres : .....
- Pulmonaires :  Asthme  Emphysème  BPCO  Apnées du sommeil  
 RAS  Autres : .....
- Allergies :  Antibiotiques : .....  Latex  Atopie  Produit de contraste  
 RAS  Autres : .....
- Digestifs :  Ulcère Gastro-duodéal  Varices oesophagiennes  Hernie hiatale  
 RAS  RGO  Autres : .....
- Endocrinaux métaboliques :  Diabète de type 1  Diabète de type 2  Dysthyroïdie  
 RAS  Dyslipidémie  Autres : .....
- Tabac : .....  Cannabis  Cocaïne
- Alcool : .....
- Antécédents transfusionnels :  Oui  Non
- Uro / Génitaux : .....
- Neurologiques :  Démence type Alzheimer  Syndrome anxieux  Parkinson  Syndrome psychiatrique  
 RAS  AVC  Syndrome dépressif  Autres : .....
- Hématologiques :  Thalassémie  Déficit G6PD  Diathèse hémorragique  
 RAS  Troubles de la coagulation  Autres : .....
- Rhumatologiques :  Hernie discale  Arthrose dorso-lombaire  Arthrose cervicale  
 RAS  Polyarthrite Rhumatoïde  Autres : .....
- Vasculaires :  Artériopathie membres inférieurs  Autres : .....
- RAS  Sténose carotidienne  Phlébite  Varices
- Ophtalmologiques : Glaucome :  Oui  Non  Autres : .....
- RAS

## Traitements en cours :

Pas de traitement en cours

Tous à poursuivre

Tous à poursuivre sauf : .....

.....

.....

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénom :

Date de naissance :

Age :

*Etiquette patient*

## Examen clinique :

Taille : ..... Poids : ..... IMC : .....

Tension artérielle : ..... Fréquence cardiaque : .....

Signes fonctionnels : .....

Auscultation : .....

- Cardio : .....

- Pneumo : .....

Rachis : .....

Etat veineux :  RAS  Facile  Difficile  Ne pas piquer à gauche

Ne pas piquer à droite

Lentilles :  Oui  Non

Piercing (localisation) : .....

Tatouage (localisation) : .....

Niveau de stress : .....

## Critères d'intubation :

• Présence d'appareils :  Haut  Bas  Non


• Etat dentaire :  Bon  Médiocre  Mauvais  Autres .....

• Mobilité du rachis cervical :  Oui  Non


• OB : .....

• DTM : .....

• MALLAMPATI :




• CORMACK :



- Intubation difficile :  Non  Oui

- Ventilation masque difficile :  Non  Oui

- Risque dentaire :  Non  Oui



## Evaluation du risque :

ASA I - II - III - IV - V Si ASA > 1, précisez : .....

Stade NYHA I - II - III - IV

Risque thrombo embolique :  Faible  Modéré  Elevé

Risque hémorragique :  Faible  Modéré  Elevé

Coronaropathie  IC  IRC  AVC  Diabète  Chirurgie à haut risque

Score de Lee : /6

Score de Duke :  1 MET  4 MET  10 MET

## Stratification du risque nutritionnel :

Grade nutritionnel 1 (GN 1) : Patient non dénutri ET chirurgie non à risque élevé de morbidité  
ET pas de facteur de risque de dénutrition

Grade nutritionnel 2 (GN 2) : Patient non dénutri ET présence d'au moins un facteur de risque de dénutrition  
OU chirurgie avec un risque élevé de morbidité

Grade nutritionnel 3 (GN 3) : Patient dénutri  
ET chirurgie non à risque élevé de morbidité

Grade nutritionnel 4 (GN 4) : Patient dénutri  
ET chirurgie avec un risque élevé de morbidité

## CONCLUSION

**Prévoir :** Post opératoire :  Réa  USC Chirurgical  Service  Autres : .....

**Type d'anesthésie proposée :** .....

<input type="checkbox"/> AG ①	<input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> ML <input type="checkbox"/> INT	<input type="checkbox"/> AL + Sédatation ① <input type="checkbox"/> Sédatation ①	<input type="checkbox"/> ALR ⑤	<input type="checkbox"/> RA ③ <input type="checkbox"/> APD ② <input type="checkbox"/> Bloc Nerv ④	<input type="checkbox"/> KT PeriN ⑤ <input type="checkbox"/> APB ⑤ <input type="checkbox"/> Topique + Sédatation ①	<input type="checkbox"/> Refus AG <input type="checkbox"/> Refus ALR
-------------------------------	--	---	--------------------------------	---	--	---

Info donnée  Anesthésie  Anesthésie loco-reg.  Anesthésie enfant  Analgésie / PCA  Ambulatoire  Transfusion  Anesthésie Péribulbaire  Autorisation parentale de soins  Risque dentaire

Equipements anesthésiques :  VVC  PCA Morphine  Sonde urinaire  Sonde nasogastrique  
 Bas à varices  Autres : .....

Antibioprophylaxie à prévoir :  Non  Oui, si oui molécule : .....

Prévention NVPO :  OUI  NON

A jeun depuis : .....  
 HGT à l'admission, suivre protocole insuline

### Examens complémentaires demandés :

- Biologie :  NF-plaq  Urée-creat-gly-iono complet  TP-TCK-fibrine  INR  
 Billi TC-Phosph.Alc-Lipase  Troponine-BNP  SGOT-SGPT-CPK-LDH  
 Autres : .....
- Consultation cardio :  Non  Oui .....
- Examens complémentaires :  Echo Cardio  Doppler MI  TSAO  
 Autres : .....
- Consultation pneumo :  Non  Oui .....
- Radio thorax :  Oui  Non  Autres : .....
- Autres : .....


**Stratégie transfusionnelle :** Groupage EFS :  Non  Oui  
Cell Saver :  Oui  Non  Ferme  Sang en réserve Quantité : .....  
 Plasma  Plaquettes  Autres : .....  
 EPO  Fer  Exacyl

### Traitements à donner le matin de l'intervention :

.....  
.....

**Consentement éclairé écrit remis :**  Oui  Non  
**Bénéfice/risque exposé et accepté :**  Oui  Non

Nom de naissance: Nom d'usage : Prénom : Date de naissance : Age :  <i>Etiquette patient</i>
--

<b>Nom et signature de l'Anesthésiste-Réanimateur</b>  
---



## 18. Visite pré anesthésique

Nom de naissance:  
Nom d'usage :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Age :

*Etiquette patient*

### Résultats des examens :

Biologie : .....

.....

.....

Cardiologie : .....

.....

.....

Pneumologie : .....

.....

.....

Autres : .....

.....

.....

### Modifications depuis la consultation d'anesthésie :

Non

Oui

Si oui, précisez : .....

.....

.....

### Confirmation de la stratégie anesthésique :

Oui

Non

Si non, précisez : .....

.....

.....

Date : ..... / ..... / .....

Nom et signature de l'Anesthésiste-Réanimateur



**SUIVI ANESTHÉSIQUE PER INTERVENTIONNEL**

**Date :** ..... / ..... / .....

**Chirurgical :** .....

**MAR :** .....

**I.A.D.E :** .....

Nom de naissance :  
 Nom d'usage :  
 Prénom :  
 Date de naissance :  
 Age :  
  
*Etiquette patient*

**Type d'intervention :** .....

**Heure induction :** .....h..... **Heure incision :** .....h.....

**Présence permanente de l'Anesthésiste**

**Type d'anesthésie :**

- |                               |                              |  |                                      |                                |   |
|-------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> AG ① | <input type="checkbox"/> MF  | <input type="checkbox"/> AL + Sédation ① | <input type="checkbox"/> ALR ⑤       | <input type="checkbox"/> RA ③  | <input type="checkbox"/> KT PeriN ⑤           |
| <input type="checkbox"/> ML   | <input type="checkbox"/> INT | <input type="checkbox"/> Sédation ①      | <input type="checkbox"/> APD ②       | <input type="checkbox"/> APB ⑤ | <input type="checkbox"/> Topique + Sédation ① |
| <input type="checkbox"/> INT  |                              |  | <input type="checkbox"/> Bloc Nerv ④ |                                |   |

- Ventilation :**  VS  VC  VPC  N2O  O2
- Circuit ouvert  Circuit fermé  Air
- Halogéné .....

**Contrôle des voies aériennes :**  Non  Oui Si oui :  IOT  INT sonde n°: .....  AD .....

Masque laryngé n°: .....

Autre : .....

**Paramètres ventilation :** .....

.....

**Ventilation au masque :**  Facile  Difficile

**Intubation :**  Facile  Difficile  Cormack :

.....

**Position opératoire :**  DD  DLD  DLG  DV

Autre : .....

**Monitoring :**  SFAR\*  ECG  PNI  SPO2  Autre : .....

SFAR\* = ECG, PNI, SPO2, FIO2, ETCO2

VVP .....  D  VVC .....

G

**Bloc nerveux périphérique**

	Nerf	Localisation			
Echo :	.....	.....	.....	.....	.....
Neuro Stimulateur :	.....	.....	.....	.....	.....
IMS :	.....	.....	.....	.....	.....
Aiguille :	.....	.....	.....	.....	.....
Produit :	.....	.....	.....	.....	.....
Quantité :	.....	.....	.....	.....	.....

**Couverture chauffante :**  Oui  Non

**Protection yeux :**  Oui  Non

**Réchauffeur de solutés :**  Oui  Non

**Sonde gastrique : N°** .....

**Sonde thermique :**  Oui  Non

**Sonde Vésicale : N°** .....

		H :					H :					H :					H :									
<b>TA</b>	220																									
<b>Pouls</b>																										
<b>SaO2</b>	200																									
<b>EtCO2</b>																										
<b>T°</b>	180																									
<b>TOF</b>																										
<b>Garrot</b>	160																									
<b>Antibioprophylaxie</b>	140																									
Molécule :																										
Dose :	120																									
Heure d'injection :																										
	100																									
	80																									
	60																									
	40																									
<b>VV1</b>																										
<b>VV2</b>																										
<b>Diurèse</b>																										
<b>Pertes sanguines</b>																										

**Transfusion :**  Non  Oui si oui Cf. dossier transfusionnel

**Cell Saver :**  Non  Oui si oui Cf. dossier transfusionnel

**Evènements indésirables :**  Non  Oui, si oui précisez : .....

.....

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénom :

Date de naissance :

Age :

*Etiquette patient*

# HÔPITAL PRIVÉ TOULON HYÈRES

SAINT JEAN

ETABLISSEMENTS SAINTE-MARGUERITE

## SURVEILLANCE POST-INTERVENTIONNELLE

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénom :

Date de naissance :

Age :

*Etiquette patient*

Date : / / 20

Nom Anesthésiste :

Type d'anesthésie :

AG ① :  MF  ML  INT

AL + Sédation ①  Sédation ①

ALR ⑤ :  RA ⑤  APD ②  Bloc Nerv ④

KT PeriN ⑥

APB ⑤

Topique + Sédation ①

Allergies :

	2	1	0
Motricité spontanée :	Bouge 4 membres	Bouge 2 membres	Immobile
Respiration :	Peut respirer profondément et tousser	Dyspnée, respiration superficielle, limitée	Apnée
Pression artérielle :	+/-20mm Hg	+/-50 mm Hg	Plus de 50 mm Hg
Etat de conscience :	Parfaitement réveillé	Se réveille à la demande	Ne répond pas aux ordres simples
Coloration :	Normale	Pâle, grisâtre marbré ictérique	Cyanosé
Saturation :	SpO2 > 92 % à l'air ambiant	Nécessité d'un apport en O2 pour maintenir la SaO2 >92%	SpO2 < 90% malgré l'apport d'O2

### Identification IDE / AS

Nom	Nom	Nom
Initiales	Initiales	Initiales
Visa	Visa	Visa

CRITERES D'ALDRETE	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:	H:
Motricité spontanée														
Respiration														
Pression artérielle TA habituelle :														
Etat de conscience														
Coloration														
Saturation														
<b>TOTAL</b>														
Pouls														
Tension Artérielle														
O2														
Fréquence respi.														
Température														
Pansement														
Drain 1														
Drain 2														
Drain 3														
Cell Saver														

Sonde nasogastrique															
Sonde à demeure															
Irrigation vésicale posée															
Irrigation vésicale vidée															
Diurèse															
Aspect des urines															
Mobilité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Sensibilité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Nausées Vomissements Post Op															
Hemocue / Saignements															
Hémoglucolest															
Voie Veineuse Périphérique 1															
Voie Veineuse Périphérique 2															
Voie Veineuse Centrale : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	KT Artériel : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non					KT Périnerveux : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non					Dispositif chauffant : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Perfusions / Injections															
Transfusions															
Examens (labo, ECG, etc..)															
Vessie de glace		Observations diverses :													
Patient porteur du bracelet d'identification : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non, si non → repose du bracelet <input type="checkbox"/>															
EVA / EN / EVS															
Initiales de l'IDE															

**Réservé Médecin**

Incidents péri anesthésiques :  Non  Oui, précisez :

Score d'Aldrete :  
EVA / EN / EVS de sortie :  
Heure de sortie :

Nom du Médecin responsable de la sortie

Signature du Médecin responsable de la sortie

Nom de naissance :  
Nom d'usage :  
Prénom :  
Date de naissance : Age :

*Etiquette patient*



# A COMPLETER PAR LE PATIENT



## II. Autorisations du patient

### 1. Autorisations

Je, soussigné(e), autorise :

- L'anesthésie générale et/ou loco-régionale
- L'intervention endoscopique
- Les soins et traitements adéquats
- Les soins et traitements du Médecin d'astreinte en cas de nécessité

Nom de naissance et signature du patient  
ou de son représentant



Je, soussigné(e) .....

autorise

n'autorise pas

un **étudiant** (infirmier(e), aide-soignant(e)...) encadré par des professionnels de chaque discipline, à réaliser des soins au cours de mon hospitalisation.

Signature du patient ou de son représentant



### 2. Cas particuliers du patient mineur ou du patient majeur sous mesure de protection (sous tutelle)

Je, soussigné(e),

*père*<sup>(1)</sup>, (nom et prénom à préciser) .....

*mère*<sup>(1)</sup>, (nom et prénom à préciser) .....

*tuteur*<sup>(1)</sup>, (nom et prénom à préciser) .....

de l'enfant ou du majeur sous tutelle (nom de naissance et prénom du patient à préciser) .....

né(e) le ..... à .....

autorise le Médecin Anesthésiste-Réanimateur à anesthésier cet enfant (ou ce majeur sous tutelle),

et le Docteur (nom et prénom du médecin à préciser) .....

à opérer et apporter tous les soins et traitements nécessaires à son état de santé.

Signature : père et mère ou tuteur<sup>(1)</sup> de l'enfant  
ou du majeur sous mesure de protection



(1) La signature des deux parents est obligatoire lorsque l'autorité parentale est conjointe (enfant né de parents mariés ou né de parents non mariés mais reconnu par les deux parents dans sa première année).  
Rayer les mentions inutiles.



## III. Engagement du patient hospitalisé

**Je m'engage** à prendre connaissance de l'intégralité des informations contenues dans le livret d'accueil qui me sera remis lors de la consultation pré-anesthésique.

**Je m'engage** à prendre connaissance des informations affichées dans le hall d'accueil et dans les couloirs, relatives en particulier aux consignes de sécurité et aux informations destinées aux patients.

**Je m'engage** à remettre lors de mon arrivée à l'infirmier(e) du service l'ensemble des médicaments en ma possession, à ne me faire amener aucun médicament de l'extérieur durant mon hospitalisation.

**Je m'engage** à ne pas apporter d'objets de valeur (argent, bijoux, chéquiers, cartes bancaires...) et dégage la responsabilité de l'Etablissement en cas de perte ou de vol des objets qui n'auront pas été placés dans le coffre mis à la disposition des patients.

**Je m'engage** à assurer une présence permanente au chevet de mon enfant de moins de 12 ans hospitalisé.

**Je m'engage** à régler les frais, non pris en charge par l'Organisme de Sécurité Sociale ou par la Mutuelle, correspondant :

- Au forfait journalier hospitalier
- Au montant du ticket modérateur (si pas de prise en charge à 100%)
- A la totalité des frais d'hospitalisation si je ne bénéficie d'aucune prise en charge
- Au complément pour honoraires libres fixés par le Praticien

**Je m'engage** à régler une participation forfaitaire de 18 €, destinée aux organismes d'Assurance Maladie selon le décret 707 du 19 juin 2006 article 1<sup>er</sup>.

**Je m'engage** à régler les frais des prestations supplémentaires que je demanderai lors de mon admission selon les tarifs en vigueur (téléphone, télévision, chambre particulière...)

**J'atteste** avoir été informé(e) que les chambres particulières ne sont attribuées que le jour de l'admission en fonction des disponibilités.

**Je m'engage à verser, le jour de mon admission, une caution / garantie globale de 350 € (excepté pour une admission en Unité de Chirurgie Ambulatoire).**

*Cette caution / garantie vous sera restituée par courrier, après le solde intégral de votre dossier (remboursement de l'établissement par la Sécurité Sociale et votre Mutuelle) sous 30 jours minimum.*

**Je m'engage à régler la majoration forfaitaire de 15 € qui sera appliquée à toute facture dont le règlement, s'il demeure à ma charge, n'est pas intervenu dans un délai d'un mois après la date de ma sortie.**

*En raison du nombre croissant d'impayés, aucune exception ne pourra être faite compte tenu de ces informations.*

**Nom de naissance et signature du patient  
ou de son représentant  
(précédée de la mention « lu et approuvé »)**





# A COMPLETER PAR LE PATIENT



## IV. Désignations / Autorisations administratives et médicales

Loi N°2202/303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

### 1. Personnes à prévenir

J'autorise l'Etablissement à contacter, en cas de nécessité administrative, la ou les personne(s) ci-après désignée(s) :

Nom, prénom : .....	Nom, prénom : .....
Lien avec le patient : .....	Lien avec le patient : .....
Tél. : .....	Tél. : .....
Portable : .....	Portable : .....

### 2. Transmissions des informations de santé à des proches

J'autorise  Je n'autorise pas

L'Etablissement à contacter, en cas de nécessité médicale, mes proches ou plus précisément la ou les personne(s) ci-après désignée(s) et que les informations concernant mon état de santé leur soient communiquées.

Nom, prénom : .....	Nom, prénom : .....
Lien avec le patient : .....	Lien avec le patient : .....
Tél. : .....	Tél. : .....
Portable : .....	Portable : .....

J'autorise  Je n'autorise pas

dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, que certaines informations de santé me concernant soient communiquées à mes ayants droit en cas de décès.

En qualité de patient hospitalisé mineur, et dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, je **n'autorise pas**  que les informations de santé me concernant soient communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Nom de naissance, prénom et signature du patient hospitalisé mineur



### 3. Transmissions des informations de santé à des professionnels de santé

Je demande  Je refuse

que les informations concernant mon état de santé soient communiquées à mon Médecin traitant et/ou au Médecin de mon choix désigné ci-après :

Nom et prénom du Médecin traitant : .....	Nom et prénom du Médecin désigné : .....
Adresse : .....	Adresse : .....
Tél. : .....	Tél. : .....

Nom de naissance et signature du patient ou de son représentant



# A COMPLETER PAR LE PATIENT



## 4. Désignation de la personne de confiance

**Important :** En application de la loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et notamment de son article L1111-6, le patient peut désigner une personne de confiance qui sera consultée dans l'hypothèse où ce même patient serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.

Je, soussigné(e) .....

**souhaite désigner une personne de confiance :**

Nom de naissance : .....  
*(de la personne de confiance)*

Nom d'usage : .....

Prénom(s) : .....

Date et lieu de naissance: .....

.....

Adresse : .....

.....

.....

Téléphone : .....

Portable : .....

- Cette personne, légalement capable, est :  Un proche  Un parent  Mon Médecin traitant
- Je souhaite que cette personne m'accompagne dans toutes mes démarches et assiste à tous les entretiens médicaux afin de m'aider dans mes décisions : oui  non

**J'ai été informé(e) que cette désignation vaut pour toute la durée de mon hospitalisation. Je peux révoquer cette désignation à tout moment et dans ce cas, je m'engage à en informer par écrit l'établissement.**

**Signature du patient ou de son représentant**

### **Réservé à la personne de confiance :**

Je, soussigné(e) .....  
certifie avoir été informé(e) de ma désignation en qualité de personne de confiance.

Fait à .....

Le .....

**Signature de la personne de confiance**

**souhaite ne pas désigner une personne de confiance :** je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité qui m'est offerte de désigner une personne de confiance pour la durée de mon séjour. Toutefois, je ne souhaite pas désigner une personne de confiance, sachant qu'à tout moment je peux procéder à une désignation, et dans cette hypothèse, je m'engage à en informer par écrit l'établissement.

**Signature du patient ou de son représentant**

## 5. Demande de non divulgation de présence

Vous avez la possibilité de conserver l'anonymat durant votre séjour au sein de notre Etablissement, pour cela il vous suffit d'en faire la demande en complétant les informations ci-dessous et d'en faire part à votre praticien ou à l'accueil de notre établissement.

Je, soussigné(e) .....

**souhaite ne pas divulguer ma présence au sein de votre Etablissement et conserver mon anonymat.**

**Signature du patient ou de son représentant**

## V. Informations médicales avant réalisation d'une endoscopie digestive


Afin que vous soyez clairement informé(e) du déroulement de cet acte médical, nous vous demandons de lire attentivement les informations suivantes.

Le médecin est à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes d'explication complémentaire.

Ces informations sont rédigées par :



### ANATOMIE DE L'APPAREIL DIGESTIF



## **INFORMATIONS MEDICALES AVANT REALISATION D'UNE COLOSCOPIE**

La coloscopie est une exploration visuelle, qui sert à mettre en évidence des anomalies du côlon. Elle est utile à votre médecin pour déterminer l'origine de vos symptômes ou pour dépister des lésions pré-cancéreuses.

### **POURQUOI CHOISIR LA COLOSCOPIE ?**

C'est actuellement l'examen de référence pour mettre en évidence des anomalies du côlon. En plus de ses grandes performances pour la détection des lésions, la coloscopie permet également de faire des prélèvements (biopsies) pour analyse ou microscope ; elle offre enfin des possibilités de traitement comme l'ablation de polypes. En l'état actuel de nos connaissances, sauf contre-indication, la coloscopie ne peut pas être remplacée par un autre examen. Lorsqu'il est nécessaire de la pratiquer, la non réalisation de la coloscopie peut avoir des conséquences préjudiciables sur votre santé en différant, ou en méconnaissant, un diagnostic potentiellement grave (polype, cancer). Dans certains cas, l'examen peut être incomplet. Un examen radiologique de l'intestin pourra alors être demandé pour visualiser la totalité du côlon. Même si l'examen est complet, de petites lésions peuvent parfois être méconnues, en particulier si la préparation n'est pas parfaite. L'exérèse de polypes n'empêche pas une éventuelle récurrence ; de nouvelles coloscopies de surveillance pourront donc s'avérer nécessaires.

### **COMMENT ENLEVE-T-ON LES POLYPES ?**

Les polypes ont un peu la forme de champignons. Certains peuvent se transformer en cancer. Lorsque leur taille et leur implantation sur la paroi intestinale le permettent, les polypes peuvent être enlevés lors d'une coloscopie. On utilise le plus souvent le bistouri électrique, qui permet de les sectionner ou de les coaguler. Dans certains cas, les polypes ressemblent plus à un tapis : on peut alors les sectionner, après les avoir soulevés, en injectant du liquide stérile sous leur base d'implantation, ou les détruire avec une coagulation au plasma Argon. Parfois, il sera nécessaire de faire une nouvelle coloscopie pour compléter le traitement ou de vous proposer un autre moyen d'enlever les polypes (chirurgie...).

### **COMMENT SE PRÉPARER POUR LA COLOSCOPIE ?**

Le côlon doit être parfaitement propre, pour permettre un examen précis et réaliser les gestes thérapeutiques utiles. Pour cela, vous devez effectuer une préparation soignée de votre intestin avant l'examen. Veuillez suivre à la lettre les instructions qui vous seront données pour cette préparation.

Aucun repas ne doit être absorbé durant les 4 à 6 heures précédant l'examen. Il est nécessaire de ne pas fumer (la cigarette augmente la sécrétion gastrique ce qui peut compliquer l'anesthésie).

Malgré des consignes bien suivies, la préparation peut parfois s'avérer insuffisante et faire renoncer à la poursuite de l'examen. Celui-ci pourra alors être reprogrammé ou complété par un examen radiologique. Si vous devez prendre des médicaments, leurs effets peuvent être modifiés par la préparation. Ceci concerne également la pilule contraceptive.

N'oubliez pas de fournir au médecin toute information concernant votre histoire médicale et les médicaments que vous prenez habituellement.

### **COMMENT VA SE DÉROULER VOTRE COLOSCOPIE ?**

L'examen utilise un appareil souple appelé endoscope qui sera introduit par l'anus. Pendant l'examen, de l'air sera insufflé pour déplisser les parois. Une sensation de ballonnement et la nécessité d'éliminer des gaz pourront être ressenties après l'examen. D'éventuels prélèvements seront réalisés en cours d'examen si votre médecin le juge nécessaire. Pour améliorer la tolérance de l'examen, une anesthésie générale est souvent proposée et programmée. Il est de la compétence du médecin anesthésiste-réanimateur de répondre à vos questions relatives à sa spécialité.

Entre chaque patient et suivant la réglementation en vigueur, l'endoscope est désinfecté et les accessoires utilisés sont, soit détruits comme les pinces à biopsie ou les aiguilles (matériel à usage unique), soit stérilisés. Ces procédures font référence pour prévenir d'éventuelles transmissions d'infections.

Il peut vous être demandé de rester hospitalisé dans les suites de l'examen pour surveillance ou en cas de complication.

### **QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR PENDANT L'EXAMEN OU LORS DU TRAITEMENT ?**

Tout acte médical et toute exploration, même conduit dans des conditions de compétences et de sécurité conformes aux données avérées de la science et de la réglementation en vigueur présentent un risque de complication. Une bonne préparation du côlon est indispensable ; elle permet un examen de meilleure qualité et réduit les risques. Elle présente également des inconvénients et des risques propres (douleurs, malaises) ; chez les personnes âgées ou à l'état de santé fragile la présence d'une personne accompagnante est conseillée pendant la préparation. La coloscopie est un examen pratiqué de façon courante et ses complications sont rares. Les principales sont les suivantes :

- Perforation des parois du côlon. Cette complication peut survenir lors de l'ablation de polypes, mais également lors d'une coloscopie diagnostique simple. Le traitement de ces perforations nécessite souvent une intervention chirurgicale avec les risques liés à cette intervention
- Hémorragies. Elles peuvent compliquer l'ablation de polypes pendant ou au décours immédiat de l'examen mais surtout dans les cinq à dix jours qui suivent. Elles sont favorisées par certains traitements qui fluidifient le sang. Elles peuvent nécessiter des transfusions sanguines.
- Dans les suites de l'examen, l'apparition ou la persistance anormale de douleurs abdominales, de sang rouge ou de selles noires, de fièvre ou de frissons, imposent de prévenir votre gastro-entérologue, ou votre médecin traitant ou l'établissement où a été pratiquée la coloscopie.

## **INFORMATIONS MEDICALES AVANT REALISATION D'UNE GASTROSCOPIE DIAGNOSTIQUE OU THERAPEUTIQUE**

**La gastroscopie diagnostique** est une exploration visuelle, qui sert à mettre en évidence des lésions de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum. Elle est utile à votre médecin, pour déterminer l'origine de vos symptômes.

**La gastroscopie thérapeutique** sert à traiter des lésions ou anomalies de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum.

### **POURQUOI CHOISIR LA GASTROSCOPIE ?**

C'est actuellement l'examen de référence pour explorer l'œsophage, l'estomac et le duodénum. Elle permet de mettre en évidence d'éventuelles lésions, de faire des biopsies (prélèvement d'un fragment de tissu pour l'étudier au microscope).

### **COMMENT SE PRÉPARER POUR LA GASTROSCOPIE ?**

Il faut être à jeun strict (sans boire, ni manger, ni fumer) durant les 6 heures précédant l'examen.

### **COMMENT VA SE DÉROULER VOTRE GASTROSCOPIE ?**

L'examen utilise un appareil souple appelé endoscope qui est introduit par la bouche ou par le nez, après dans certains cas, une anesthésie locale. Le plus souvent, vous êtes installé (e), couché (e) sur le côté gauche. L'examen n'est pas douloureux. Vous n'êtes pas gêné (e) pour respirer car l'endoscope ne va pas dans les poumons. En revanche il faut maintenir une respiration bien régulière durant toute la durée de l'examen afin d'éviter d'éventuelles nausées. Par ailleurs, vous devez éviter d'avaler votre salive, en la laissant s'écouler à l'extérieur de votre bouche sur une protection. Pendant l'examen, de l'air est insufflé pour déplisser les parois et peut vous occasionner de petits renvois d'air. D'éventuels prélèvements sont réalisés en cours d'examen si votre médecin le juge nécessaire.

Pour améliorer la tolérance de l'examen une anesthésie générale peut être programmée. Il est alors de la compétence du médecin anesthésiste-réanimateur de répondre à vos questions relatives à sa spécialité.

Entre chaque patient et suivant la réglementation en vigueur, l'endoscope est désinfecté et l'ensemble des accessoires utilisés (pinces à biopsies...) est stérilisé ou jeté (matériel à usage unique). Ces procédures font références pour prévenir d'éventuelles transmissions d'infections.

Il peut vous être demandé de rester hospitalisé dans les suites de l'hospitalisation ou en cas de complications.

### **QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR PENDANT L'EXAMEN ?**

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication.

Les complications de la gastroscopie sont très exceptionnelles. Ce sont en particulier : la perforation, l'hémorragie, les troubles cardio-vasculaires et respiratoires et l'infection. Elles peuvent nécessiter une hospitalisation. Elles peuvent être favorisées par vos antécédents médico-chirurgicaux ou par la prise de certains traitements.

Dans certains cas une intervention chirurgicale, des transfusions peuvent être nécessaire.

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent lors de l'endoscopie, mais peuvent également se révéler quelques jours après l'examen (douleurs abdominales et du thorax, vomissements de sang rouge ou noir, toux, fièvre, frissons...).

Il est alors très important de contacter immédiatement le médecin et/ou l'anesthésiste qui se sont occupés de vous.

En cas d'impossibilité de prendre contact avec eux, il est très important de prendre contact très rapidement avec votre médecin traitant.

## **INFORMATIONS MEDICALES AVANT REALISATION D'UN CATHETERISME ENDOSCOPIQUE BILIO-PANCREATIQUE**

Le cathétérisme endoscopique bilio-pancréatique peut être utile pour déterminer l'origine de vos troubles et peut dans certains cas permettre leur traitement.

### **POURQUOI PRATIQUER UN CATHÉTÉRISME ENDOSCOPIQUE BILIO-PANCREATIQUE ?**

Cet examen permet d'étudier les voies biliaires et le pancréas. Il est employé en fonction des circonstances, quand les autres examens sont insuffisants pour conclure sur la cause de troubles d'ordre bilio-pancréatique. Il peut montrer des calculs, un rétrécissement tumoral ou inflammatoire, ou d'autres maladies plus rares des voies biliaires ou pancréatiques. Enfin, il peut permettre de traiter certaines de ces maladies en alternative ou en association avec la chirurgie.

### **COMMENT RÉALISE-T-ON LE CATHÉTÉRISME ENDOSCOPIQUE BILIO-PANCREATIQUE ?**

Les voies biliaires et pancréatiques se drainent dans la partie initiale de l'intestin (duodénum) à travers un sphincter puis par un orifice appelé papille. L'examen utilise un appareil souple appelé endoscope qui est glissé par la bouche jusque dans le duodénum. Il se déroule dans une salle de radiologie. Le cathétérisme diagnostique consiste à introduire dans la papille à partir du duodénum un cathéter pour injecter les voies biliaires et/ou pancréatiques avec du produit de contraste. Il est alors réalisé des radiographies. A la suite de ces radiographies et pendant la même séance, il peut être pratiqué un traitement. La première phase du traitement consiste le plus souvent à sectionner le sphincter (sphinctérotomie endoscopique) à l'aide d'un bistouri électrique. Ensuite, les calculs peuvent être enlevés à l'aide d'un panier ou d'un ballon, éventuellement en les fragmentant au préalable. En cas de rétrécissement, celui-ci peut être dilaté par un ballonnet ou une bougie, ou il peut être mis en place un drain (prothèse) définitif ou temporaire à travers ce rétrécissement.

Parfois il sera nécessaire de répéter la procédure pour compléter le traitement après avoir discuté des possibilités thérapeutiques.

Entre chaque patient et suivant la réglementation en vigueur, l'endoscope est désinfecté et les accessoires utilisés sont stérilisés ou jetés (matériel à usage unique). Ces procédures font référence pour prévenir d'éventuelles transmissions d'infections.

Pour améliorer la tolérance de l'examen, une anesthésie générale est souvent programmée. Il est de la compétence du médecin anesthésiste-réanimateur de répondre à vos questions relatives à sa spécialité. Habituellement, cet examen a lieu dans le cadre d'une hospitalisation pour surveillance.

### **COMMENT SE PRÉPARER POUR LE CATHÉTÉRISME ENDOSCOPIQUE BILIO-PANCREATIQUE ?**

Il faut être à jeun strict (sans boire, ni manger, ni fumer) durant les 6 heures précédant l'examen.

### **QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR PENDANT L'EXAMEN ?**

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conforme aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, présente un risque de complication.

Les complications du cathétérisme diagnostique sont rares quand seules des radiographies sont réalisées. Il s'agit d'une inflammation aiguë du pancréas (pancréatite aiguë), d'une perforation ou d'une infection des voies biliaires ou de la vésicule biliaire.

Les complications de la sphinctérotomie endoscopique et des traitements associés sont plus fréquentes : pancréatite aiguë, infection des voies biliaires ou de la vésicule biliaire, perforation de la paroi digestive, hémorragie digestive. La fréquence de chacune de ces complications est de l'ordre de 1%.

D'autres complications sont exceptionnelles, telles que les troubles cardio-vasculaires ou respiratoires. Ces complications peuvent être favorisées par vos antécédents médico-chirurgicaux ou par la prise de certains médicaments.

Toutes ces complications peuvent nécessiter une prolongation de l'hospitalisation et rendre une opération nécessaire. L'hémorragie peut conduire à pratiquer des transfusions de sang ou de dérivés sanguins.

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent lors de l'endoscopie, mais peuvent également se révéler quelques jours après l'examen (douleurs abdominales, jaunisse, sang rouge ou noir dans les selles, fièvre, frissons...). Il est alors important de contacter immédiatement le médecin et/ou l'anesthésiste qui se sont occupés de vous.

En cas d'impossibilité de prendre contact avec eux, il est très important de prendre contact très rapidement avec votre médecin traitant.

## **INFORMATIONS MÉDICALES AVANT RÉALISATION D'UNE ECHO-ENDOSCOPIE**

L'échoendoscopie est une exploration qui combine une approche échographique et une approche endoscopique. Une sonde d'échographie est ainsi amenée à l'aide d'un endoscope à proximité de l'organe à étudier. Elle sert à rechercher ou à explorer des lésions du tube digestif ou des organes de voisinage.

### **POURQUOI CHOISIR L'ECHO-ENDOSCOPIE ?**

Elle permet d'obtenir des informations qui ne peuvent pas être apportées par les autres explorations. Dans certains cas, elle peut permettre de réaliser des prélèvements de fragments de tissu à étudier au microscope.

### **COMMENT SE PRÉPARER POUR L'ECHO-ENDOSCOPIE ?**

Il faut être à jeun strict (sans boire, ni manger, ni fumer) durant les 6 heures précédant l'examen.

### **COMMENT VA SE DÉROULER VOTRE ECHO-ENDOSCOPIE ?**

L'examen utilise un appareil souple appelé échoendoscope. Pour améliorer la tolérance de l'examen, une anesthésie générale est souvent proposée et programmée. Il est alors de la compétence du médecin anesthésiste réanimateur de répondre à vos questions relatives à sa spécialité.

Entre chaque patient et suivant la réglementation en vigueur, l'endoscope est désinfecté et les accessoires sont stérilisés ou jetés (matériel à usage unique). Ces procédures font références pour prévenir d'éventuels transmissions d'infections.

Il peut vous être demandé de rester hospitalisé(e) pour surveillance dans les suites de l'examen en particulier en cas de prélèvement ou de complication.

### **QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR PENDANT L'EXAMEN ?**

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication.

Les complications de l'échoendoscopie sont exceptionnelles :

- des perforations en particulier œsophagiennes peuvent survenir. Elles sont souvent favorisées par des lésions sous-jacentes (tumeur...). Une intervention chirurgicale (avec ses propres risques) peut alors s'avérer nécessaire.
- d'autres complications sont possibles telles que les troubles cardio-vasculaires ou respiratoires et les infections.
- en cas de prélèvements, de rares cas d'infections ou d'hémorragies ont été rapportés. Une intervention chirurgicale et des transfusions de sang ou de dérivés sanguins sont parfois nécessaires.

Ces complications peuvent être favorisées par vos antécédents médico-chirurgicaux ou par la prise de certains médicaments.

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent lors de l'écho-endoscopie mais peuvent également se révéler quelques jours après l'examen (douleurs abdominales ou thoraciques, fièvre, frissons ...).

Il est alors très important de contacter immédiatement le médecin et/ou l'anesthésiste qui se sont occupés de vous.

En cas d'impossibilité de prendre contact avec eux, il est très important de prendre contact très rapidement avec votre médecin traitant.

## **SI VOTRE EXAMEN IMPOSE L'UTILISATION D'UN APPAREIL DE RADIOLOGIE...**

La radiographie utilise des rayons X.

L'injection de produit de contraste fait apparaître l'organe concerné au moyen d'une simple radiographie. L'organe est ainsi « dessiné » et le médecin peut alors l'étudier, faire un diagnostic, des interventions (prélèvement, pose de prothèse, extraction de calcul).

En matière d'irradiation des patients (exposition à des rayons dans un but médical diagnostique ou thérapeutique) aucun risque n'a pu être démontré compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises.

A titre d'exemple, une radiographie simple correspond à l'exposition moyenne naturelle (soleil) lors d'un voyage de 4h en avion. Toutefois, des précautions pour les femmes enceintes doivent être prises : il est important de signaler si vous êtes dans ce cas.

Vous serez exposé à une source de rayonnements ionisants dans un but diagnostique et thérapeutique. Cette exposition fait l'objet d'une analyse risque bénéfique (avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter).

La justification de cette exposition s'appuie sur des recommandations de pratiques cliniques de l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) et sur les avis d'experts. Ainsi, conformément au décret n°2003-270 du 24 mars 2003, seront appliqués le principe de justification, d'optimisation des expositions aux rayonnements ionisants.

Votre examen fera systématiquement l'objet d'un rapport de dose.



# A SIGNER PAR LE PATIENT




## VI. Validation de la prise de connaissance des informations contenues dans ce livret

Je, soussigné(e), atteste avoir pris connaissance :

- des informations relatives à la transfusion sanguine et aux médicaments dérivés du sang (pages 6 à 7)
- des informations relatives à la prise en charge de la douleur (page 8)
- des informations relatives au risque de surdosage et d'interactions encourus lors de l'utilisation non contrôlée et non médicalement validée de médicaments (page 8)
- des informations relatives à la douche préopératoire dans le cadre de la prévention des infections nosocomiales (pages 8 à 9)
- des informations générales avant toute intervention chirurgicale, des informations spécifiques relatives à la chirurgie ambulatoire et à l'endoscopie (fibroscopie/ coloscopie...) (pages 9 à 10)
- des informations concernant l'interdiction de fumer (page 10)
- des documents à apporter en vue de la consultation pré-anesthésique (page 11)
- des informations relatives à l'anesthésie (pages 16 et 17)
- des informations médicales avant la réalisation d'une endoscopie digestive (pages 35 et suivantes)

Nom de naissance et signature du patient  
ou de son représentant


---



**La Direction, le Personnel et l'Équipe médicale  
vous remercient du temps consacré à la prise de connaissance  
des nombreuses informations de ce livret,  
indispensable à votre prise en charge dans notre établissement,  
conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).**

**... NOTES ...**

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

**... NOTES ...**

A series of horizontal dotted lines for writing notes.